

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy

XLVI Egzamin dla Aktuariuszy z 2 czerwca 2008 r.

1

Część II

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:

Czas egzaminu: 100 minut

Warszawa, 2 czerwca 2008 r.

1. Rozważamy trzy populacje z następującymi funkcjami natężenia wymierania:

$$\mu_x^{(1)} = 3,5; \mu_x^{(2)} = 2x; \mu_x^{(3)} = x^2, \text{ dla } x > 0.$$

Obliczyć $x > 0$ oraz $t > 0$ spełniające warunek:

$${}_t p_x^{(1)} = {}_t p_x^{(2)} = {}_t p_x^{(3)}$$

Wybrać wartości najbliższe.

- (A) $x = 0,56, t = 2,25$
- (B) $x = 0,58, t = 2,27$
- (C) $x = 0,60, t = 2,29$
- (D) $x = 0,62, t = 2,31$
- (E) $x = 0,64, t = 2,33.$

2. Niech x będzie liczbą całkowitą dodatnią. Natomiast niech $u \in (0,1)$. Wówczas przy założeniu UDD składka jednorazowa \bar{a}_{x+u} wyraża się wzorem:

(A)

$$\frac{q_x - \delta + u\delta q_x - e^{u\delta}(q_x + id\ddot{a}_x - i)}{\delta^2(uq_x - 1)}$$

(B)

$$\frac{q_x + \delta - u\delta q_x - e^{u\delta}(q_x + id\ddot{a}_x - i)}{\delta^2(uq_x - 1)}$$

(C)

$$\frac{q_x - \delta - u\delta q_x - e^{u\delta}(q_x - id\ddot{a}_x - i)}{\delta^2(uq_x - 1)}$$

(D)

$$\frac{q_x - \delta + u\delta q_x - e^{u\delta}(q_x - id\ddot{a}_x - i)}{\delta^2(uq_x - 1)}$$

(E)

$$\frac{q_x + \delta + u\delta q_x - e^{u\delta}(q_x + id\ddot{a}_x - i)}{\delta^2(uq_x - 1)}$$

3. Rozpatrujemy ciągły model ubezpieczenia. Dane są:

$$\delta = 0,05 ; \bar{P}(\bar{A}_{30:\overline{20}|}) = 0,393385 ; \bar{P}(\bar{A}_{30:\overline{20}|}^{\frac{1}{4}}) = 0,339972 .$$

Obliczyć przybliżoną wartość:

$$\bar{P}(\bar{A}_{30:\overline{20-\frac{1}{12}}|})$$

Wybrać odpowiedź najbliższą.

- (A) 0,380823
- (B) 0,385823
- (C) 0,390823
- (D) 0,395823
- (E) 0,400823.

4. Za jednorazową składkę brutto $G = 25$ osoba w wieku (65), wylosowana z populacji de Moivre'a z wiekiem granicznym $\omega = 100$, kupuje polisę emerytalną, która będzie jej wypłacać rentę dożywotnią z intensywnością 1 na rok (model ciągły) a dodatkowo w przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku $65 + G$ wypłaci uposażonym kwotę $G - T(65)$. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi $\delta = 0,02$. Obliczyć jaki procent składki brutto zajmuje składka netto.

Wybrać odpowiedź najbliższą.

- (A) 74,6%
- (B) 78,6%
- (C) 82,6%
- (D) 86,6%
- (E) 90,6%.

5. Rozpatrujemy ubezpieczenie dyskretne ogólnego typu dla (30) o następujących parametrach. Świadczenia śmiertelne c_{k+1} „dochodzą” do poziomu 100000 zł przez pierwsze 5 lat; dokładniej:

$$c_1 = 20000, c_2 = 40000, c_3 = 60000, c_4 = 80000 \text{ oraz}$$

$$c_{k+1} = 100000 \text{ dla } k + 1 \geq 5.$$

Regularne składki netto π_j również rosną liniowo do docelowego poziomu π :

$$\pi_0 = \frac{\pi}{5}, \pi_1 = \frac{2\pi}{5}, \pi_2 = \frac{3\pi}{5}, \pi_3 = \frac{4\pi}{5} \text{ oraz}$$

$$\pi_j = \pi \text{ dla } j \geq 4.$$

Obliczyć rezerwę składek netto po 5 latach.

Dane są:

$$R_{30} = 228700,26 ; S_{30} = 9436053,45 ;$$

$$D_{35} = 24226,77 ; M_{35} = 6756,7639 ; N_{35} = 454220,222 ; R_{35} = 194063,86 ; \\ S_{35} = 6764065,32.$$

- (A) 3586
- (B) 3606
- (C) 3626
- (D) 3646
- (E) 3666.

6. Rozważamy ubezpieczenie 40-letnie na życie dla (25), które wypłaca 100000 zł w chwili śmierci. Składki netto płacone są w postaci renty życiowej ciągłej (nie dłużej niż przez najbliższe 40 lat) z odpowiednio dobraną stałą intensywnością

$$\bar{P}(\bar{A}_{25:\overline{40}|}^1) \cdot 100000 = 500.$$

Niech dalej t_{max} oznacza moment w którym rezerwa $V(t)$ osiąga wartość maksymalną. Obliczyć $V(t_{max})$, jeżeli wiadomo, że:

$$\mu_{25+t_{max}} = 0,01 \quad \text{oraz} \quad \delta = 0,05.$$

Wybrać odpowiedź najbliższą.

- (A) 8133 zł
- (B) 8333 zł
- (C) 8533 zł
- (D) 8733 zł
- (E) 8933 zł.

7. Rozważamy polisę ciągłą ogólnego typu o następujących parametrach.

Ubezpieczony (x) pochodzi z populacji o wykładniczym rozkładzie trwania życia z $\mu_{x+t} = \text{const} = 0,01$. W przypadku śmierci w wieku $x + t$ zostanie wypłacone świadczenie w wysokości $c(t)$. Składki netto są opłacane za pomocą renty życiowej ciągłej ze stałą intensywnością $\pi(t) = \text{const} = 0,02$, natomiast rezerwa $V(t)$ ewoluuje zgodnie ze wzorem $V(t) = 0,01t$. Techniczna intensywność oprocentowania δ wynosi $\delta = 0,05$.

Obliczyć wariancję straty ubezpieczyciela $\text{Var}(L)$ na moment wystawienia polisy.

- (A) 0,13
- (B) 0,15
- (C) 0,17
- (D) 0,19
- (E) 0,21

8. Niech $T(m)$ oznacza dalsze trwanie życia męża, obecnie w wieku (30).

Podobnie, niech $T(k)$ oznacza dalsze trwanie życia żony, obecnie w wieku (20). Gęstość $g(u, v)$ rozkładu łącznego $(T(m), T(k))$ dana jest wzorem;

$$g(u, v) = \frac{1}{8000} - \frac{(u - 40) \cdot (v - 50)}{16000000}$$

dla $0 \leq u \leq 80, 0 \leq v \leq 100$. Obliczyć współczynnik korelacji zmiennych $T(m)$ i $T(k)$.

- (A) -0,30
- (B) -0,33
- (C) -0,36
- (D) -0,39
- (E) 0.

9. Żona (60) należy do populacji de Moivre'a z wiekiem granicznym $\omega_k = 120$. Natomiast mąż (65) należy do populacji de Moivre'a z wiekiem granicznym $\omega_m = 90$. Za jednorazową składkę netto $SJN = 1$ mogą kupić jedną z emerytur małżeńskich typu $EM(a, b)$, gdzie $a \geq 0, b \geq 0$. Wypłaty emerytury z polisy $EM(a, b)$ dokonywane są w formie renty życiowej ciągłej z intensywnością a na rok póki oboje żyją, a po pierwszej śmierci owdowiałej osobie wypłaca się z intensywnością b aż do jej śmierci. Obliczyć parametry a, b dla których najmniejsza jest wariancja straty ubezpieczyciela $Var(L)$ na moment wystawienia polisy.

Techniczna intensywność oprocentowania wynosi $\delta = 0,03$.

Wybierz wartości najbliższe.

(A) $a = 0,045 ; b = 0,037$

(B) $a = 0,049 ; b = 0,039$

(C) $a = 0,053 ; b = 0,041$

(D) $a = 0,057 ; b = 0,043$

(E) $a = 0,061 ; b = 0,045$.

10. Pracownicy przedsiębiorstwa ABZ pochodzą z populacji de Moivre'a z wiekiem granicznym $\omega = 100$, przy czym dla każdej liczby całkowitej $x \in [20,60]$, zatrudnionych jest dokładnie $100 - x$ pracowników w wieku x . Ubezpieczenie grupowe, którym objęci są wszyscy pracownicy polega na tym, że w przypadku śmierci w wieku $x + t$ uposażeni pracownika otrzymają świadczenie 2 gdy $0 < t < 5$, albo 4, gdy $5 < t < 15$. Suma ubezpieczenia wypłacana jest w chwili śmierci. Gdy pracownik w początkowym wieku x dożyje wieku $x + 15$ polisa wygasa. Wszyscy pracownicy niezależnie od początkowego wieku zapłacą taką samą („uśrednioną”) składkę. Jaki procent pracowników będzie subsydiował to ubezpieczenie grupowe? Przeprowadzić rachunki netto. Przyjąć techniczną intensywność oprocentowania na poziomie $\delta = 0,07$.

Podaj odpowiedź najbliższą.

- (A) 51,3%
- (B) 54,3%
- (C) 57,3%
- (D) 60,3%
- (E) 63,3%

XLVI Egzamin dla Aktuariuszy z 2 czerwca 2008 r.**Matematyka ubezpieczeń życiowych****Arkusz odpowiedzi***

Imię i nazwisko :

Pesel

Zadanie nr	Odpowiedź	Punktacja •
1	C	
2	A	
3	A	
4	D	
5	A	
6	B	
7	E	
8	B	
9	E	
10	C	

- Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w *Arkuszu odpowiedzi*.
- Wypełnia Komisja Egzaminacyjna.